

# 水稻瓦版～カメムシ編～

## 斑点米カメムシ（大型・小型）



イネカメムシ（大型）



ホソハリカメムシ(大型)



クモハリカメムシ（大型）



アカスジカスミカメ（小型）

近年、印旛地域では  
大型カメムシ類である  
イネカメムシが多く  
発生しています。



### ★防除対策★

5月～6月頃の畦畔除草がカメムシを寄せ付けないポイントです。  
稲の出穂間近での除草作業は雑草にいたカメムシを圃場内に追い出し、  
かえって加害を助長する恐れがあります。このため、圃場周辺の除草は出穂2週間前までに  
行いましょう。


薬剤名	適用内容
スタークル粒剤	使用薬量：3kg/10a 使用時期：収穫7日前 使用回数：3回以内 使用方法：散布
スタークル豆粒	使用薬量：250g/10a 使用時期：収穫7日前 使用回数：3回以内 使用方法：散布
Mr. ジョーカー粉剤 DL	散布薬量：3~4kg/10a 使用時期：収穫7日前 使用回数：2回以内 使用方法：散布
キラップ粒剤	使用薬量：3kg/10a 使用時期：収穫14日前 使用回数：2回以内 使用方法：湛水散布

※上記の登録内容は令和4年5月時点になりますので、使用時には必ずラベルをお読みください。

JA 西印旛では、ザクサ+ダイロンゾルをすることにより長期間雑草を抑制することができますので、これらの商品をおススメしております。

※混用の際にはダイロンゾルを先に入れてください。

	水10L	水18L	水20L	水100L
ダイロンゾル (400倍)	25ml	45ml	50ml	250ml
ザクサ (100倍)	100ml	180ml	200ml	1L
散布面積	1m×50m (1アール)	1m×90m (1.8アール)	1m×100m (2アール)	1m×1km (10アール)



水稻カメムシ防除薬剤相談会  
10:00~14:30

6月17日(金)経済センター  
6月20日(月)東部支店

7月8日(金)経済センター

ぜひお越しください！

【お問い合わせ】

JA 西印旛経済部 営農指導涉外課  
0476-48-2207