

## あなたもチャレンジ！ 家庭菜園

芸研究家●成松次郎

### コールラビ 肥大した茎を利用する野菜

コールラビは地中海北岸原産のアブラナ科野菜で、茎の基部が球形に肥大するので、別名を球茎甘藍（キュウケイカンラン）とも呼ばれます。キャベツから分化した野菜のため似た性質を持ちますが、キャベツより暑さや寒さに強く、作りやすい野菜です。

中間地の秋まきは、7月下旬～9月上旬に種まきし、9～12月に収穫します。春まきは3、4月にまいて、6、7月に収穫します。

「品種」 球の色が緑白の「グランドデューク」（タキイ種苗）、紫の「パープルデューク」（タキイ種苗）などがあります。

「畑の準備」 あらかじめ畑1平方mあたりに苦土石灰100gを土とよく混ぜておき、植え付け（または種まき）1週間前に畝幅70～80cm、深さ15～20cmの溝を掘ります。次に、この溝1m当たり化成肥料（NPK各成分10％程度）100gと堆肥1kg程度を施し、土を戻して畝を立てます（図1）。

「種まき・苗作り」 苗作りをするには、7・5～9cmポリポットに種を4、5粒まき、発芽後に適宜密生部を間引き、一本立ちにして本葉4、5枚まで育てます（図2）。強健な野菜なので畑にじかまきしても良いでしょう。この場合は種を2、3cm間隔にまいて、間引きながら最終株間を約20cmにします。

「植え付け」 本葉4、5枚の頃、株間を約20cmに植え付けます（図3）。このとき植え穴に十分水を注ぎ、植え傷みの少ないようにします。

「追肥・土寄せ」 追肥は植え付け後20日ごろ、株元に化成肥料を1株約10g施用し、土寄せします（図4）。2回目は球が肥大する頃に施用します。生育が進み、下葉が傷んでいたら切り落としても良いでしょう。

「病害虫の防除」 ヨトウムシ、コナガなどが多いので、登録農薬で駆除します。生育初期は、寒冷しやなどの防虫ネットでトンネル被覆し、害虫の被害を防ぐと良いでしょう。

「収穫」 球の直径が5～10cmのときに、株元から刈り取って収穫します（図5）。球が大きくなると肉質が堅くなります。堅い皮はむいて薄くスライスし、サラダなどにします。また、さいころ状に刻んで、スープ、ポトフなどでいただきます。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

## 栽培カレンダー(コールラビ)

|     | まきどき | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 冷涼地 | 春まき  |    | ●  | ▲  | ■  | ■  | ■  |    |     |     |     |    |    |
|     | 秋まき  |    |    | ●  | ▲  | ■  | ■  | ■  | ■   |     |     |    |    |
| 中間地 | 春まき  | ●  | ▲  | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |    |    |
|     | 秋まき  |    | ●  | ▲  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |    |    |
| 暖地  | 春まき  | ●  | ▲  | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |    |    |
|     | 秋まき  |    | ●  | ▲  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■  |    |

● 種まき    - - - 生育    ▲ 植え付け    — 生育    ■ 収穫

図1 畑の準備




図2 種まき・苗作り




図3 植え付け




図4 追肥・土寄せ



図5 収穫



